



### ยาที่ใช้ในการรักษาโรคหืด

#### กลุ่มยาขยายหลอดลมหรือยาบรรเทาอาการจับหืด

ยาบรรเทาอาการ (reliever) เป็นยาที่มีฤทธิ์ป้องกันและรักษาอาการหืดเกร็งของหลอดลมที่เกิดขึ้น แนะนำให้ใช้ยาขยายหลอดลมเฉพาะในกรณีที่มีอาการเท่านั้น และไม่ควรใช้เกิน ๓-๔ ครั้ง/วัน และห้ามไม่ให้ใช้ยาขยายหลอดลมเป็นประจำสม่ำเสมอ

ยาในกลุ่มนี้ คือ  $\beta$ -adrenergic agonist แบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม ตามระยะเวลาการออกฤทธิ์ ดังนี้

๑. ออกฤทธิ์เร็วและระยะสั้น (๔-๖ ชั่วโมง) เช่น salbutamol, terbutaline, procaterol และ fenoterol เป็นต้น



salbutamol



terbutaline



procaterol



ยาสูตรผสม fenoterol

๒. ออกฤทธิ์นานมากกว่า ๑๒ ชั่วโมง ได้แก่ formoterol และ salmeterol



ยาสูตรผสม formoterol



ยาสูตรผสม salmeterol

เอกสารอ้างอิง :

๑. มูลนิธิโรคหืดแห่งประเทศไทย. สุชาติ จิระจักรวัฒนา. การรักษาโรคหืด ยาใหม่ในการรักษา. สืบค้น ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕, จาก <https://www.asthma.or.th>
๒. แนวทางการวินิจฉัยและรักษาโรคหืดในประเทศไทยสำหรับผู้ป่วยเด็ก พ.ศ. ๒๕๕๑. สืบค้น ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕, จาก [http://thaipediatics.org/attachfile/cpg\\_๑๑-๐๕-๒๓.pdf](http://thaipediatics.org/attachfile/cpg_๑๑-๐๕-๒๓.pdf)

ผู้ตั้งบทความ : ภาณุ กุลธิดา เหลืองอ่อน // Email : vck\_rx@hotmail.com

ดาวน์โหลดข่าวสารนี้  
ที่ QR CODE ด้านล่างนี้

