


สถานการณ์การติดเชื้อ HIV ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประจำปี 2567

กรุงเทพมหานคร มีจำนวนประชากรในพื้นที่ 5,494,932 คน เป็นเพศชาย 2,571,974 คน เพศหญิง 2,922,958 คน เป็นกลุ่มเยาวชนที่มีอายุน้อยกว่า 25 ปี 1,387,604 คน เป็นเพศชาย 710,661 คน เพศหญิง 676,943 คน (ที่มา: กรมการปกครอง ณ เดือน ธันวาคม 2565) ในปี 2567 คาดการณ์ว่า จากจำนวนประชากรในพื้นที่ทั้งหมด มีจำนวนกลุ่มประชากรที่เข้าถึงยาก และเป็นกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสติดเชื้อเอชไอวี มากกว่ากลุ่มประชากรอื่น ได้แก่ ชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย 77,029 คน (จำแนกเป็นกลุ่มเสี่ยงสูง 43,359 คน และกลุ่มเสี่ยงต่ำ 33,671 คน) ชายขายบริการทางเพศ 4,428 คน กลุ่มสาวประเภทสอง 27,891 คน พนักงานบริการทางเพศหญิง 14,185 คน ผู้ใช้สารเสพติดชนิดฉีด 11,123 คน (ที่มา: ผล คาดประมาณสถานการณ์เอชไอวี AEM กทม.ปี 2566)

ปัจจุบันกรุงเทพมหานครได้ทำการคาดการณ์ว่ามีผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีชีวิตอยู่ในปี 2567 จำนวน 89,768 คน เป็นผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ จำนวน 1,095 คน ในจำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ เป็นกลุ่มเยาวชนที่มีอายุน้อยกว่า 25 ปี จำนวน 478 คน (คิดเป็นร้อยละ 44) มีผู้เสียชีวิตภายในปี 2567 จำนวน 1,744 คน ข้อมูลจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (NAP Program : ณ 7 ต.ค. 66) ในปี พ.ศ.2566 พบว่า มีผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยและทราบสถานะการติดเชื้อเอชไอวี และมีชีวิตอยู่ จำนวน 86,133 คน จากจำนวนนี้มีผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ได้รับยาต้านไวรัส จำนวน 66,240 คน โดยเป็นผู้รับยาต้านรายใหม่ จำนวน 4,302 คน และมีผลการตรวจพบว่ามีปริมาณไวรัสในกระแสเลือดน้อยกว่า 1,000 copies/mL จำนวน 56,056 คน

ผลการเฝ้าระวังความชุกการติดเชื้อเอชไอวี พื้นที่กรุงเทพมหานคร ปี 2566 พบความชุกในกลุ่มพนักงานบริการทางเพศหญิงในสถานที่สาธารณะ(FSW-Non-Venue) ร้อยละ 0.8 และกลุ่มพนักงานบริการทางเพศหญิงในสถานบริการ(FSW-Venue) ร้อยละ 0.7 ส่วนในกลุ่มชายที่มาตรวจรักษา กามโรค(MSTD) พบความชุกการติดเชื้อเอชไอวี ร้อยละ 12.5 และกลุ่มผู้ใช้สารเสพติดชนิดฉีด (PWID) ร้อยละ 11 ในขณะที่การติดเชื้อเอชไอวี กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ (ANC) ตัวแทนของกลุ่มประชากรทั่วไปมีความชุกการติดเชื้อเอชไอวี ร้อยละ 1.11 ส่วนการเฝ้าระวังการติดเชื้อเอชไอวี ในกลุ่มประชากรหลัก หรือกลุ่มประชากรที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี ร่วมกับกองระบาดวิทยา ในปี 2566 ผลการเฝ้าระวังการติดเชื้อเอชไอวี และพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวี(BBS) ในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย พบว่า กลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์กับชายติดเชื้อเอชไอวี ร้อยละ 1.68 และกลุ่มสาวประเภทสอง (TG) ร้อยละ 4 จากสถานการณ์ดังกล่าว กลุ่มเป้าหมายที่เข้าถึงยากและกลุ่มเยาวชนยังมีความชุกของการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มาก ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องพร้อมกับการส่งเสริมความเท่าเทียมในการเข้าถึงบริการสุขภาพในทุกกลุ่มประชากร เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย ยุติปัญหาเอดส์ และบรรลุเป้า 95-95-95ภายในปี 2573 ต่อไป

ความชุกการติดเชื้อ HIV ปี พ.ศ.2566



ANC ใช้ข้อมูลจาก ระบบรายงาน PHIMS

จำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ ปี พ.ศ.2566 จำแนกตามกลุ่มประชากร

