



ด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ

ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๓๑๙ ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ยาชุดอันตราย

หยุดซื้อ หยุดใช้ !!



ยาชุด มีตัวยาหลายชนิดรวมอยู่ในซองเดียว ผู้ขายจัดรวมเป็นชุด สำหรับกินครั้งละ 1 ชุด มีรูปแบบและสีของยาแตกต่างกันไป ไม่แน่กว่าเป็นยาชนิดใด ควรกินเวลาไหน มักมียาตั้งแต่ 3-5 เม็ดหรือมากกว่าต่อชุด บรรจุในซองพลาสติกใส ที่ซองอาจมีชื่อยาและสรรพคุณที่มักโอ้อวดเกินจริง

อันตรายจากการกินยาชุด



ได้รับยาเกินขนาด

เช่น ยาชุดแก้ปวดเมื่อย 1 ชุด จะมียาแก้ปวด 2-3 เม็ด เมื่อรับประทานเข้าไป โอกาสในการได้รับอันตรายจากผลข้างเคียงหรืออาการไม่พึงประสงค์ของยาจึงมีเพิ่มขึ้น



ได้รับยาเกินจำเป็น

เช่น ยาชุดแก้ไอหวัด ประกอบด้วย ยาแก้ปวด แก้ไอ ยาลดน้ำมูก ยาทำให้ง่วงนอน ยาแก้ไอ ยาปฏิชีวนะ ซึ่งในบางครั้งผู้ซื้ออาจไม่มีอาการไอ หรือใช้ จึงไม่จำเป็นต้องทานยาเหล่านี้



ยาชุดที่มีจำหน่าย มักมียาสเตียรอยด์ร่วมด้วย

เพื่อทำให้อาการของโรคบรรเทาโดยเร็ว แต่ยาสเตียรอยด์มีผลข้างเคียงสูง หากรับประทานไม่ถูกต้อง จะทำให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย เช่น กระดูกพรุน บวม น้ำ ความดันโลหิตต่ำ



ได้รับยาไม่ครบขนาด

เช่น ยาปฏิชีวนะ ซึ่งจำเป็นต้องทานให้ครบขนาด มิฉะนั้นจะเกิดการดื้อยา ทำให้ต้องใช้ยาแรงขึ้น เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น



มักพบยาเสื่อมคุณภาพรวมในยาชุด

ยาปลอม หรือยาไม่ได้มาตรฐาน

คำแนะนำ เพื่อความปลอดภัย ก่อนรับประทานยา ควรปรึกษาแพทย์ หรือเภสัชกรก่อนใช้ยา

เอกสารอ้างอิง

1. ศูนย์วิทยบริการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข. ยาชุดสุดอันตราย [ออนไลน์]; 2565 [เข้าถึงเมื่อ 29/08/2022].

เข้าถึงได้จาก: http://elib.fda.moph.go.th/library/default.asp?page2=subdetail&id_L1=27&id_L2=19683&id_L3=2568

2. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข. ยาชุดอันตราย อย่าซื้อ อย่าใช้ [ออนไลน์]; ๒๕๖๕ [เข้าถึงเมื่อ ๒๙/๐๘/๒๐๒๒].

เข้าถึงได้จาก: https://oryor.com/media/infoGraphic/media_printing/1669

ผู้ตั้งบทความ : ภญ.ณัฐนันท์ จิตรภิรมย์

// Email : vck_rx@hotmail.com

ดาวน์โหลดข่าวสารนี้

ที่ QR CODE ด้านล่างนี้



กองเภสัชกรรม สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

๓๒๐ ม.๖ ซ.เคหะชุมชนท่าทราย แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐ โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๘๗๘๒

