



ASPIRIN

“ยาแอสไพริน”



แอสไพริน

เป็นยาในกลุ่ม Non Steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs หรือ เอ็นเสด) ใช้สำหรับลดการอักเสบ ปวด บวม แดง ลดไข้ อีกทั้งยังใช้สำหรับป้องกันการเกิดหลอดเลือดอุดตันได้อีกด้วย โดยขนาดยาแอสไพริน ขึ้นกับข้อบ่งใช้และดุลพินิจของแพทย์

- แก้อาการ ปวด อักเสบ ลดไข้ จะใช้ขนาดยาที่สูง คือ แอสไพริน ขนาด 325 – 650 มิลลิกรัม ทุก 4 – 6 ชั่วโมง หรือใช้เมื่อมีอาการ และรับประทานยาหลังอาหารทันที
- สำหรับป้องกันโรคหลอดเลือดอุดตัน และรักษาโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ควรปรึกษาแพทย์ก่อนเริ่มใช้ยานี้ และปฏิบัติตามคำแนะนำในการใช้ยา โดยรับประทานยาหลังอาหารทันที เพื่อลดการระคายเคือง

ข้อควรระวังเมื่อใช้ยาแอสไพริน

1. ระวังการใช้ยาในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดเลือดออก เช่น ผู้ป่วยโรคเลือดออกผิดปกติ ผู้ป่วยไข้เลือดออก
2. ผู้ป่วยที่กำลังจะเข้ารับการผ่าตัด ถอนฟัน ควรแจ้งแพทย์ทุกครั้ง ห้ามหยุดยาเอง
3. ไม่ควรหักแบ่งยา และหลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์ระหว่างรับประทานยา
4. ห้ามใช้ในผู้ป่วยที่แพ้ยาแอสไพริน และยาอื่น ๆ ในกลุ่ม NSAIDs
5. หลีกเลี่ยงการใช้ยาแอสไพรินในผู้ป่วยโรคหืด และสตรีมีครรภ์ โดยเฉพาะไตรมาสแรก

“ หากพบอาการผิดปกติหลังจากรับประทานยา
ควรปรึกษาแพทย์ หรือเภสัชกร ”

เอกสารอ้างอิง

๑. พรชนก สายเชื้อ. ยาแอสไพริน ช่วยป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง. เภสัชกรรมคลินิก ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล [ออนไลน์]; เข้าถึงได้จาก: <https://www.rama.mahidol.ac.th/ramachanne/article/>
๒. วิภากรักษ์ บุญมาก. แอสไพริน (aspirin). ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. [ออนไลน์]; เข้าถึงได้จาก: <https://pharmacy.mahidol.ac.th/th/service-knowledge-article-info.php?id=๒๕๗>

ผู้ตั้งบทความ : ญญ.ลักษิกา ชินพจนานนท์ // Email : vck_rx@hotmail.com

ดาวน์โหลดข่าวสารนี้
ที่ QR CODE ด้านล่างค่ะ

