



ข่าวสาร ด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ




ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๑๙๐ ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV)



2 1 3

- มะเร็งปากมดลูกพบมากเป็นอันดับสองรองจากมะเร็งเต้านมในประชากรหญิงไทย
- ในแต่ละปีพบผู้ป่วยประมาณ 10,000 คน และเสียชีวิตถึง 5,000 รายต่อปี
- สาเหตุมาจากการติดเชื้อไวรัส Human Papillomavirus หรือเชื้อไวรัสเอชพีวี (HPV) ทำให้เซลล์บริเวณปากมดลูกเจริญผิดปกติและเปลี่ยนเป็นมะเร็งปากมดลูก



สามารถฉีดวัคซีนได้ตั้งแต่อายุ 9-26 ปี และก่อนมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก โดยจะต้องไม่เคยติดเชื้อมาก่อน ซึ่งการฉีดวัคซีนสามารถป้องกันการติดเชื้อ HPV ได้ร้อยละ 90-100 ภายใน 1 เดือนหลังจากได้รับวัคซีนครบ 3 เข็ม



การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกยังคงเป็นสิ่งจำเป็น เนื่องจากวัคซีนไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อได้อย่างสมบูรณ์



วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV)

วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV) เป็นวัคซีนที่มีความปลอดภัยสูง ไม่พบอาการข้างเคียงรุนแรง แต่สามารถพบอาการปวด บวม แดง คัน บริเวณที่ฉีดวัคซีนได้



ในบางรายอาจมีอาการปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน อ่อนเพลีย ผื่นคันตามตัว และอาจมีไข้ ดังนั้นหลังฉีดวัคซีนควรนอนพักเพื่อสังเกตอาการอย่างน้อย 30 นาที และไม่ควรขับรถหรือเดินทางกลับบ้านโดยลำพัง



เอกสารอ้างอิง

มะเร็งปากมดลูก กับ วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก(HPV), สำนักคณะกรรมการอาหารและยา, กระทรวงสาธารณสุข. แหล่งสืบค้น https://women.oryor.com/detail/media_printing/1347; วันที่สืบค้น 15 มิ.ย. 60