



ข่าวสาร ด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ



ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๒๐๙ ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ยาที่ควรระวังการใช้ในผู้ป่วยที่มีภาวะสมองเสื่อม



- * สมองเสื่อมเป็นภาวะที่สมองเริ่มทำงานน้อยลง ในด้านความจำ ภาษา การประมวลผล และสมาธิ
- * พบบ่อยในผู้ที่อายุเกิน ๖๕ ปี
- * เกิดจากหลายสาเหตุ เช่น การเสื่อมของเซลล์สมองจากโรคอัลไซเมอร์, โรคพาร์กินสัน เป็นต้น ส่งผลให้สารสื่อประสาทในสมองมีปริมาณลดลง ซึ่งส่งผลในเรื่องความจำ
- * ยาที่รบกวนการทำงานของสารสื่อประสาท อาจทำให้ผู้ป่วยที่มีภาวะสมองเสื่อมมีอาการแย่ลง ได้แก่

ยาแก้แพ้กลุ่มที่ทำให้ง่วง

Chlorpheniramine, Brompheniramine, Hydroxyzine, Triprolidine, Diphenhydramine, Dimenhydrinate

ยาลดอาการกล้ามเนื้อ

Orphenadrine

ยาด้านอาการซึมเศร้า

Amitriptyline, Imipramine, Doxepine, Clomipramine

ยาด้านอาการโรคจิต

Chlorpromazine, Thioridazine, Perphenazine

ยาลดอาการบีบเกร็งของทางเดินอาหาร

Belladonna alkaloids, Hyoscyamine

ยาลดอาการสั่นในผู้ป่วยพาร์กินสัน/ลดอาการตัวแข็งจากยาด้านอาการโรคจิต

Benzotropine, Trihexyphenidyl

เอกสารอ้างอิง

๑. สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์. แนวทางเวชปฏิบัติภาวะสมองเสื่อม. แหล่งที่มา http://thaidementia.org/Uploads/files/๑_แนวทางเวชปฏิบัติภาวะสมองเสื่อม๕๗.pdf สืบค้นเมื่อ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑
๒. มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย. ยาแก้นอนหลับ. แหล่งที่มา <http://www.thaidementia.org/core/productFile/๑๔๙.pdf> สืบค้นเมื่อ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑
๓. จุฑามณี สุทธิสิริสังข์. สมองเสื่อมกับยาที่ต้องระวัง. แหล่งที่มา <http://www.pharmacy.mahidol.ac.th/th/knowledge/article/๔๐๘/สมองเสื่อม-ยา/> สืบค้นเมื่อ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑



กองเภสัชกรรม สำนักกอนามัย กรุงเทพมหานคร ๓๒๐ ม.๖ ซ.เคหะชุมชนท่าทราย แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐
โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๘๗๘๒ ต่อ ๓๐๓, โทรสาร ๐ ๒๕๕๐ ๖๘๔๒

