



ข่าวสาร ด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ




ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๒๑๖ ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

อุบัติเหตุจากการใช้ยา

อุบัติเหตุป้องกันได้ ถ้าไม่ประมาท อุบัติเหตุจากการใช้ยาก็เช่นเดียวกัน สามารถป้องกันได้ ถ้าอ่านฉลากยาให้เข้าใจทุกครั้งก่อนใช้ยา โดยอุบัติเหตุที่เกิดจากการใช้ยาอาจเกิดจากหลายสาเหตุ ได้แก่

จากผลข้างเคียงของยา เช่น ยาแก้แพ้ ที่ช่วยบรรเทาอาการ ลดน้ำมูก แพ้อากาศ ผื่นคัน ลมพิษ ได้แก่ คลอร์เฟนิรามีน (Chlorpheniramine) บรอมเฟนิรามีน (Brompheniramine) ไฮดรอกซีซีน (Hydroxyzine) เป็นต้น ยาเหล่านี้เมื่อรับประทานเข้าไปแล้วจะมีผลข้างเคียงจากยาคือทำให้วังงซึม จึงต้องระวังอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการขับขี่ยานพาหนะหรือควบคุมเครื่องจักร เพราะอาจเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้



จากการรับประทานยาดัดขนาด เช่น การรับประทานยาลดน้ำตาลในเลือดเกินขนาดที่แพทย์สั่ง เนื่องจากผู้ป่วยละเลยการอ่านฉลากยาให้ละเอียดก่อนใช้ยา อาจทำให้ใจสั่น เป็นลม หหมดสติ เนื่องจากน้ำตาลในเลือดต่ำจนเกิดอันตราย

จากการใช้ยาภายนอก เช่น ยาหม่อง หากใช้ทา ถู บริเวณผิวหนังบางๆ เช่น ผิวหนังของเด็กเล็ก อาจทำให้มีอาการแสบร้อน ระคายเคืองผิวหนังได้ หากทาบริเวณรอบดวงตา ไอระเหยจากยาหม่องจะทำให้แสบตา ระคายเคืองตา ซึ่งจะก่อให้เกิดอันตรายเนื่องจากส่งผลต่อการมองเห็น



ดังนั้น ก่อนใช้ยาทุกครั้ง ควรอ่านฉลากยาให้ละเอียด เพื่อให้ใช้ยาได้อย่างถูกต้องปลอดภัย และหากมีข้อสงสัยในการใช้ยา ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

เอกสารอ้างอิง : กลุ่มเภสัชกรชุมชน. ยาน่ารู้. เล่ม1. กรุงเทพฯ: อักษรสัมพันธ์; 2531.

ผู้ตั้งบทความ : ญญ.ธมลวรรณ ผลประเสริฐ E-mail : vck_rx@hotmail.com



กองเภสัชกรรม สำนักงานมัย กรุงเทพมหานคร ๓๒๐ ม.๖ ซ.เคหะชุมชนท่าทราย แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐
โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๘๗๘๒ ต่อ ๓๐๓, โทรสาร ๐ ๒๕๕๐ ๖๘๕๒

