



ข่าวสาร ด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ



ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๒๒๙ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

วิธีการใช้ยาปฏิชีวนะชนิดผงแห้ง

เมื่อเด็กเล็กมีอาการไม่สบายและแพทย์ได้ตรวจวินิจฉัยว่ามีการติดเชื้อแบคทีเรีย โดยยาปฏิชีวนะส่วนใหญ่จะเป็น ยาปฏิชีวนะชนิดผงแห้ง หรือยาฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ซึ่งต้องผสมน้ำก่อนใช้ ดังนั้นวิธีการผสมและการเก็บรักษายาปฏิชีวนะที่ผสมแล้วจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ควรศึกษาและปฏิบัติให้ถูกต้องเพื่อให้ได้รับยาที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย

ข้อปฏิบัติทั่วไปในการผสมยาปฏิชีวนะชนิดผงแห้งแบบรับประทาน

1. เคาะขวดยาเพื่อให้ผงยาในขวดร่วน ไม่จับกันเป็นก้อน
2. ใช้น้ำต้มสุกที่เย็นแล้ว หรือน้ำสะอาด (ห้ามใช้น้ำอุ่นหรือน้ำร้อน เนื่องจากอาจทำให้ยาบางชนิดเสื่อมสภาพได้) เติมน้ำลงในขวดประมาณครึ่งหนึ่งของขีดที่กำหนด หรือพอท่วมผงยา
3. ปิดฝาขวดเขย่าให้ยากระจายตัว ไม่จับเป็นก้อนแข็ง
4. เติมน้ำให้ถึงขีดที่กำหนดไว้บนขวดยา แล้วเขย่าอีกครั้งเพื่อให้ยากระจายเข้ากันดี



คำแนะนำการใช้ยาปฏิชีวนะชนิดผงแห้งที่ผสมน้ำแล้ว

- เขย่าขวดก่อนใช้ทุกครั้ง
- ยาที่ผสมแล้ว สามารถเก็บที่อุณหภูมิห้องได้นาน 7 วัน ถ้าเก็บในตู้เย็นจะสามารถเก็บได้นาน 2 สัปดาห์ ไม่เก็บไว้ในตู้เย็นช่องแข็ง สำหรับยาผงที่ยังไม่ได้ผสมน้ำ สามารถเก็บได้ตามวันหมดอายุที่อยู่บนฉลาก
- กรณีที่ได้รับยามากกว่า 1 ขวด ควรผสมทีละขวด รับประทานยาขวดแรกหมดก่อน แล้วจึงผสมยาขวดที่ 2
- ต้องรับประทานยาปฏิชีวนะจนครบตามกำหนด เพื่อป้องกันการเกิดเชื้อดื้อยา

เอกสารอ้างอิง :

1.Chan GC, Tang SF. Parental knowledge, attitudes and antibiotic use for acute upper respiratory tract infection in children attending a primary healthcare clinic in Malaysia. Singapore Med J. 2006;47:266-70.

2.สุชาติดา ชุติมาวรัตน์, บรรณาธิการ. คู่มือทักษะตามเกณฑ์ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สภาเภสัชกรรม. กรุงเทพฯ, 2554.

ผู้ตั้งบทความ : ญญ.ชนิดา ธีระนันท์กุล E-mail : vck_rx@hotmail.com

ดาวน์โหลดข่าวสารนี้
ที่ QR CODE ด้านล่างค่ะ



กองเภสัชกรรม สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ๓๒๐ ม.๖ ซ.เคหะชุมชนท่าทราย แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐
โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๘๗๘๒ ต่อ ๓๐๓, โทรสาร ๐ ๒๕๕๐ ๖๘๕๒

