



# ข่าวสาร ด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ




ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๒๓๕ ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

## ยาปฏิชีวนะกินให้ครบตามแพทย์สั่ง

**ยาปฏิชีวนะ** คือ ยาฆ่าเชื้อแบคทีเรีย มีหลายชนิด หลายกลุ่ม ซึ่งแต่ละกลุ่มก็จะสามารถรักษาอาการติดเชื้อในแต่ละบริเวณของร่างกายได้แตกต่างกันไป ตัวอย่างเช่น ยาเพนนิซิลิน อะม็อกซิซิลิน เตตราซัยคลิน ไม่มีฤทธิ์ลดการอักเสบ

**ยาแก้อักเสบ** (ยาต้านการอักเสบ) เป็นยาที่มีฤทธิ์ลดการอักเสบ ลดไข้ บรรเทาปวด ลดบวม เช่น แอสไพริน ไอบูโพรเฟน ไม่มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย

ดังนั้น เราไม่ควรเรียกยาปฏิชีวนะ ว่ายาแก้อักเสบ เนื่องจากอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิด และเกิดอันตรายจากการใช้ยาได้



สิ่งสำคัญของการกินยาปฏิชีวนะคือ **ควรกินติดต่อกันให้ครบตามที่แพทย์หรือเภสัชกรแนะนำอย่างเคร่งครัด** และต้องกินตามคำแนะนำของยาแต่ละชนิดที่ได้มา เช่น กินก่อนหรือหลังอาหาร ห้ามกินร่วมกับอาหารบางประเภท เป็นต้น เนื่องจากเมื่อกินยาฆ่าเชื้อไปจำนวนหนึ่งทำให้เชื้อลดจำนวนลงและส่งผลให้อาการต่างๆ เริ่มดีขึ้น หากหยุดกินยาปฏิชีวนะไปก่อนครบกำหนด หรือกินยาไม่สม่ำเสมอจะทำให้ปริมาณยาในร่างกายไม่เพียงพอที่จะกำจัดเชื้อให้เหลือน้อยจนโรคหรืออาการติดเชื้อต่างๆ หายขาด เชื้อจะแบ่งตัวเพิ่มจำนวนอีกแล้วเกิดการเป็นซ้ำ หรืออาจทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า “การดื้อยา” ได้

### เอกสารอ้างอิง

- สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา. ยาปฏิชีวนะ. แหล่งที่มา [https://oryor.com/oryor\\_miniweb/knowledge\\_detail.php?cat=2&id=8](https://oryor.com/oryor_miniweb/knowledge_detail.php?cat=2&id=8) ค้นเมื่อ 1 มีนาคม 2562.
  - นศภ. ทิชญา รอดเจริญ. กินยาฆ่าเชื้อไม่ครบ ทำไมจึงดื้อยา. แหล่งที่มา [https://www.pharmacy.mahidol.ac.th/dic/knowledge\\_full.php?id=16](https://www.pharmacy.mahidol.ac.th/dic/knowledge_full.php?id=16) ค้นเมื่อ 1 มีนาคม 2562.
- ผู้ตั้งบทความ: ภญ. ณัฐสินี วิสุทธุกุล Email: vck\_rx@hotmail.com

ดาวน์โหลดข่าวสารนี้  
ที่ QR CODE ด้านล่างค่ะ



กองเภสัชกรรม สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ๓๒๐ ม.๖ ซ.เคหะชุมชนท่าทราย แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐  
โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๘๗๘๒ ต่อ ๓๐๓, โทรสาร ๐ ๒๕๕๐ ๖๘๕๒

