



ข่าวสาร ด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ




ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๒๕๒ ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ยาต้านการเกิดลิ่มเลือด/เกล็ดเลือดกับการถอนฟัน



ยาต้านเกล็ดเลือด และยาต้านการแข็งตัวของเลือด เป็นกลุ่มยาที่ใช้รักษาและป้องกันโรคเกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือด มีหน้าที่ป้องกันไม่ให้เกิดลิ่มเลือดอุดตัน หลอดเลือดและอวัยวะต่าง ๆ เช่น ปอด สมอง หลอดเลือดดำใหญ่บริเวณแขน ขา เป็นต้น



ถ้าผู้ป่วยไม่หยุดยาต้านลิ่มเลือด / เกล็ดเลือด ก่อนถอนฟัน

1. ไม่มีรายงานเกี่ยวกับภาวะเลือดออกที่รุนแรงจนไม่สามารถควบคุมได้
2. การห้ามเลือดเฉพาะที่หลังการถอนฟันสามารถลดภาวะเลือดออกได้มากกว่า 90 %
3. ภาวะเลือดออกทำให้ผู้ป่วยรู้สึกไม่สะดวกสบายเท่านั้น ไม่มีอันตรายถึงชีวิตหรือเกิดความพิการ



ตัวอย่างยาต้านเกล็ดเลือด



แอสไพริน (ASPIRIN)

โคลพิโดเกรลา (CLOPIDOGREL)

พราซูเกรลา (PRASUGREL)

ทิกาคิกรอลอร์ (TICAGRELOR)

ตัวอย่างยาต้านลิ่มเลือด

วอร์ฟาริน (Warfarin)	เฮปาริน (Heparin)
อีโนกซาพาริน (Enoxaparin)	เอพิซาแบน (Apixaban)
โรวาร็อกซาแบน (Rivaroxaban)	ดาบิกาเทรน (Dabigatran)

ดังนั้น

การรักษาทางทันตกรรมและการศัลยกรรมเล็กในช่องปาก **ไม่จำเป็นต้องหยุดยาต้านการเกิดลิ่มเลือด** เพราะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดหลอดเลือดอุดตัน โดยเฉพาะหลอดเลือดหัวใจและสมอง ซึ่งอันตรายมากกว่าการรับประทานยาต่อแล้วเกิดภาวะเลือดออก โดยที่การเกิดภาวะเลือดออกนั้นสามารถห้ามเลือดได้ด้วยวิธีห้ามเลือดเฉพาะที่



เอกสารอ้างอิง

1. กิธรินส์ดี เชียงเงินธัญกุล. ยาต้านเกล็ดเลือดและยาต้านการแข็งตัวของเลือดกับการรักษาทางทันตกรรม: บทความปริทัศน์. วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2561;21:189-204

2. นวรัตน์ พันธไพศาล. การถอนฟันในผู้ป่วยที่ได้รับยาต้านการเกิดลิ่มเลือด [อินเทอร์เน็ต]. กรุงเทพฯ: มูลนิธิส่งเสริมสิทธิอันในประเทศไทย (มสท.);2561 [เข้าถึงเมื่อ 26 พ.ย. 2562]. เข้าถึงได้จาก:

http://www.ftqm.or.th/images/document/symposium/2018-19/Present/PL_07_Presentation.pdf

ผู้ตั้งบทความ : ภก.ปิยญา วัฒนเชาวน์พิสุทธิ์

////

Email : vck_rx@hotmail.com

ดาวน์โหลดข่าวสารนี้

ที่ QR CODE ด้านล่างนี้



กองเภสัชกรรม สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ๓๒๐ ม.๖ ซ.เคหะชุมชนท่าทราย แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐

โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๘๗๘๒ ต่อ ๓๐๓, โทรสาร ๐ ๒๕๕๐ ๖๘๔๒

