



# ข่าวสาร ด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ



ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๒๕๔ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

## ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับยาคุมฉุกเฉิน



**ยาคุมฉุกเฉินไม่ควรใช้คุมกำเนิดระยะยาว**



**ยาคุมฉุกเฉินสามารถใช้คุมกำเนิดระยะยาวได้**

มีวิธีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการคุมกำเนิดระยะยาวมากกว่า เช่น การกินยาคุมกำเนิดชนิดแผง 21 เม็ด, ชนิดแผง 28 เม็ด หรือการฉีดยาคุมกำเนิด เป็นต้น



**ยาคุมฉุกเฉินไม่ใช่ยาทำแท้ง**



**ยาคุมฉุกเฉินเป็นยาทำแท้ง**

ยาคุมฉุกเฉินสามารถป้องกันการตั้งครรภ์ได้เท่านั้น ซึ่งจะไม่มีผลกับไข่ที่ผสมกับอสุจิ และได้ฝังตัวที่ผนังมดลูกแล้ว



**ยาคุมฉุกเฉินไม่ช่วยป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์**



**ยาคุมฉุกเฉินป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้**

ยาคุมฉุกเฉินไม่สามารถป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ แต่การใช้ถุงยางอนามัย เป็นวิธีการคุมกำเนิดที่สามารถคุมกำเนิด และป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้



**ยาคุมฉุกเฉินมีประสิทธิภาพในการคุมกำเนิด เมื่อกินเม็ดที่ 1 ไม่เกิน 72 ชั่วโมง**



**ยาคุมฉุกเฉินต้องกินภายใน 24 ชั่วโมงเท่านั้น**

ยาคุมฉุกเฉินมีประสิทธิภาพในการคุมกำเนิดได้ เมื่อกินเม็ดที่ 1 ไม่เกิน 72 ชั่วโมง หลังการมีเพศสัมพันธ์ โดย

- เมื่อกินเม็ดที่ 1 ภายใน 24 ชั่วโมง สามารถป้องกันการตั้งครรภ์ได้ 85%
- เมื่อกินเม็ดที่ 1 ภายใน 72 ชั่วโมง สามารถป้องกันการตั้งครรภ์ได้ 75%

เอกสารอ้างอิง :

1. สถาบันสุขภาพเด็กและวัยรุ่นราชชนครินทร์. รู้จักยาคุมฉุกเฉินกันสักนิด [อินเทอร์เน็ต]. 2563 [เข้าถึงเมื่อ 22 มกราคม 2563]. เข้าถึงได้จาก <http://new.smartteen.net/infographic/92>
2. LloydsPharmacy Online Doctor. Morning After Pill Myths [อินเทอร์เน็ต]. 2558 [เข้าถึงเมื่อ 22 มกราคม 2563]. เข้าถึงได้จาก <https://onlinedoctor.lloydspharmacy.com/blog/morning-after-pill-myths/>

ผู้ตั้งบทความ : ภญ. ญาตีวีร์ ศรีศษ E-mail : vck\_rx@hotmail.com

ดาวน์โหลดข่าวสารนี้  
ที่ QR CODE ด้านล่างค่ะ



กองเภสัชกรรม สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ๓๒๐ ม.๖ ซ.เคหะชุมชนท่าทราย แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐  
โทร. ๐ ๒๕๔๐ ๘๗๘๒ ต่อ ๓๐๓, โทรสาร ๐ ๒๕๔๐ ๖๘๘๒

