



ข่าวสาร ด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ



ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๒๕๘ ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓



การใช้ผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ล้างมือ

การใช้ผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ล้างมือ เพื่อความสะอาดในการพกพา และใช้ในกรณีที่ไม่สะดวกในการล้างมือด้วยน้ำและสบู่

คำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ล้างมือ

- หากใช้เป็นครั้งแรกควรทดสอบการแพ้ก่อน โดยการทาผลิตภัณฑ์ปริมาณเล็กน้อยที่บริเวณท้องแขนและทิ้งไว้ 24 ชั่วโมง สังเกตความผิดปกติ ได้แก่ ผื่นแดง ปวดแสบปวดร้อน บวม
- เทผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ล้างมือ 2-3 มิลลิลิตร ใส่ลงในฝ่ามือ ถูให้ทั่วสองมือเป็นเวลาประมาณ 20 วินาที และปล่อยให้แห้ง
- ควรเก็บผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ล้างมือในบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิท ในบริเวณที่ไม่ถูกแสง หรือบริเวณที่ร้อน เพราะจะทำให้แอลกอฮอล์ระเหย และอาจทำให้ความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ลดลงได้



ข้อควรระวัง

- ผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ล้างมือ มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ล้างมือในปริมาณมาก สามารถติดไฟได้ หากทาแล้วยังไม่แห้งสนิท ควรหลีกเลี่ยงเปลวไฟ โดยเฉพาะผู้ที่สูบบุหรี่ ควรระวังเป็นพิเศษ
- ไม่ควรใช้ผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ล้างมือกับเด็กทารก และบริเวณผิวหนังที่บอบบาง เช่น บริเวณรอบดวงตา และบริเวณที่มีผิวหนังอักเสบ มีสิ่ว บาดแผล เนื่องจากหากสัมผัสกับแอลกอฮอล์บ่อยๆ อาจทำให้เกิดการระคายเคือง

เอกสารอ้างอิง :

1. Centers for Disease Control and Prevention. Coronavirus Disease 2019 (COVID-19): Prevention & Treatment [Internet]. 2020 [cited 2020 Feb 25]. Available from: <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/about/prevention-treatment.html>
2. ผลิตภัณฑ์เจลล้างมือ; สำนักเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข.

ผู้ตั้งบทความ : ธมลวรรณ ผลประเสริฐ Email : vck_rx@hotmail.com

ดาวน์โหลดข่าวสารนี้
ที่ QR CODE ด้านล่างค่ะ



กองเภสัชกรรม สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ๓๒๐ ม.๖ ซ.เคหะชุมชนท่าทราย แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐
โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๘๗๘๒ ต่อ ๓๐๓, โทรสาร ๐ ๒๕๕๐ ๖๘๔๒

