



ข่าวสาร ด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ



ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๒๘๑ ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ข้อแนะนำในการใช้ยา ของคุณแม่ที่ให้นมลูก

- หลีกเลี่ยงการใช้ยา ยกเว้นกรณีที่มีความจำเป็น
- หลีกเลี่ยงการใช้ยาสูตรผสม
- เลือกใช้ยารูปแบบภายนอก หรือยาสูดพ่น ก่อนการเลือกใช้ยารับประทาน
- หากมีความจำเป็นต้องใช้ยา ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ก่อนการใช้ยา



การเลือกใช้ในโรคที่พบบ่อย สำหรับ คุณแม่ที่ให้นมลูก

ยาแก้คลื่นไส้ อาเจียน

ดอมเพอริโดน

ยาแก้ปวด ลดไข้

พาราเซตามอล

ไอบูโพรเฟน

ยาแก้แพ้ ลดน้ำมูก

ชนิดไม่ทำให้ง่วง : เซทิริซิน

ชนิดทำให้ง่วง : คลอเฟนิรามีน

ยาลดอาการคัดจมูก

รูปแบบพ่น

ซูโดเอเฟดรีน

ยาลดกรด

ยาลดกรดชนิดน้ำ

ยาฆ่าเชื้อแบคทีเรีย

อะม็อกซิซิลิน

เตตราไซคลีน

เอกสารอ้างอิง : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา, คุณแม่ให้นมลูก ฉลาดเลือกใช้ยา ทางไกลอันตรายต่อลูกน้อย.

ผู้ตั้งบทความ : ภญ. ญาดวีร์ ศรีคช

E-mail : vck_rx@hotmail.com

ดาวน์โหลดข่าวสารนี้

ที่ QR CODE ด้านล่างนี้



กองเภสัชกรรม สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ๓๒๐ ม.๖ ซ.เคหะชุมชนท่าทราย แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐

โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๘๗๘๒ โทรสาร ๐ ๒๕๕๐ ๘๐๒๓

