



ด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ

ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๒๙๖ ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



การให้ยาในเด็กเล็ก

อุปกรณ์ป้อนยาเด็ก

- **หลอดดูดยา (syringe)** เหมาะสำหรับเด็กเล็กอายุน้อยกว่า 1 ปี หรือเด็กที่กินยาก
- **ช้อนชา** 1 ช้อนชา = 5 มิลลิลิตร
- **ช้อนโต๊ะ** 1 ช้อนโต๊ะ = 3 ช้อนชา = 15 มิลลิลิตร
- **ข้อควรระวัง** เนื่องจากเด็กมีความจำเป็นต้องได้รับยาในปริมาณที่ถูกต้องตามแพทย์สั่ง จึงไม่ควรใช้ช้อนชา หรือช้อนโต๊ะที่รับประทานอาหารมาใช้ในการตวงยา ซึ่งจะทำให้ได้ปริมาณยาไม่ตรงตามที่กำหนด



ป้อนยาทีละชนิด

ควรป้อนยาทีละชนิด เนื่องจากการผสมยาอาจทำให้เกิดปฏิกิริยาระหว่างยาและอาจทำให้เกิดผลเสียต่าง ๆ เช่น ทำให้ยามีฤทธิ์เพิ่มขึ้น หรือลดลง หรือทำให้เกิดพิษ เป็นต้น



ห้ามผสมยากับนม

- เนื่องจากยาอาจจับกับแคลเซียมในนม และทำให้ยาไม่ออกฤทธิ์
 - เด็กอาจได้รับยาไม่ครบ หากกินนมไม่หมด
- แต่หากจำเป็นต้องผสม ควรผสมกับน้ำหวานหรือน้ำผึ้งแทน

เอกสารอ้างอิง : ระบบเครือข่ายเภสัชสนเทศประชาชนถ. 7 เคล็ดลับการใช้ยาเด็ก [อินเทอร์เน็ต]. 2558 [เข้าถึงเมื่อ 27 กันยายน 2564].

เข้าถึงได้จาก http://prachanath.su.ac.th/DIS/npt_bch/article/articleshow.php?article_id=5

ผู้ตั้งบทความ : ภญ. ญาดวีร์ ศรีศษ

// Email : vck_rx@hotmail.com

ดาวน์โหลดข่าวสารนี้

ที่ QR CODE ด้านล่างนี้



กองเภสัชกรรม สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

๓๒๐ ม.๖ ซ.เคหะชุมชนท่าทราย แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐ โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๘๗๘๒

