

## Chlorhexidine Gluconate 0.12% Mouthwash

### ข้อบ่งใช้ :

- ใช้สำหรับฆ่าเชื้อ และรักษาสุขอนามัยในช่องปาก
- รักษาโรคติดเชื้อราในช่องปาก (Oral Candidiasis)
- รักษาอาการเหงือกอักเสบ ฟันผุ
- ป้องกันการสะสมของคราบจุลินทรีย์

**เงื่อนไข** : กลุ่มยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ (ED ก)

### ขนาดและวิธีใช้ :

อมกลั้วให้ทั่วช่องปาก ด้วยน้ำยาประมาณ 15 – 30 ซีซี นานประมาณ 1 นาที แล้วบ้วนทิ้ง วันละ 2 ครั้ง หลังอาหารเช้าและก่อนนอน หรือตามคำแนะนำของแพทย์



### อาการไม่พึงประสงค์ :

- การรับรู้รสเปลี่ยนไป (taste alteration)
- เยื่อช่องปากหลุดลอก (oral desquamation)
- ต่อมน้ำลายอักเสบชั่วคราว (transient parotitis)

### ข้อห้ามใช้ :

- ห้ามใช้ในผู้ที่แพ้ยา Chlorhexidine Gluconate
- ควรระมัดระวังการใช้ยาในเด็ก สตรีมีครรภ์ และให้นมบุตร

### References :

1. Martindale The Complete Drug Reference 36<sup>th</sup> Edition. pp. 1635-1638.
2. MIMS แหล่งข้อมูล : <https://www.mims.com/Thailand/drug/info/chlorhexidine?mtype=generic>. ค้นเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2564.
3. บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2563. 90-91.