

PVP-Iodine Gargle (0.2% Iodine)

ข้อบ่งใช้ :

- ใช้สำหรับฆ่าเชื้อ และรักษาสุขอนามัยในช่องปาก
- รักษาอาการคออักเสบ ทอนซิลอักเสบ เยื่อหูช่องปากอักเสบ เหงือกอักเสบ
- ป้องกันการติดเชื้อจากแผลในช่องปาก รวมถึงแผลจากการถอนฟัน หรือการผ่าตัดในช่องปาก

เงื่อนไข : กลุ่มยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ (ED ก)

ขนาดและวิธีใช้ :

อมกลืนให้ทั่วช่องปาก ด้วยน้ำยาประมาณ 15 – 30 ซีซี นานประมาณ 30 วินาที แล้วบ้วนทิ้ง วันละ 2 – 4 ครั้ง หรือตามคำแนะนำของแพทย์



อาการไม่พึงประสงค์ :

- ระคายเคืองในช่องปากและลำคอ
- เยื่อหูช่องปากหลุดลอก หรือผิวเยื่อหูช่องปากไม่เรียบเนียน
- คลื่นไส้

ข้อห้ามใช้ :

- ผู้ที่มีประวัติแพ้ไอโอดีน
- การกอายุต่ำกว่า 6 เดือน
- สตรีมีครรภ์ และให้นมบุตร
- ผู้ที่มีความผิดปกติของต่อมไทรอยด์
- ผู้ที่มีภาวะไตวาย

References :

1. Martindale The Complete Drug Reference 36th Edition. pp. 1659.
2. MIMS แหล่งข้อมูล : <https://www.mims.com/Thailand/drug/info/povidone%20iodine?mtype=generic>. ค้นเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2564.
3. บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2563. 50.