

THIORIDAZINE 10, 25 MG TAB

ชื่อการค้า : TIDAZINE®



ข้อบ่งใช้ : Schizophrenia

กลุ่มยา : Typical Antipsychotics (Phenothiazines)

เงื่อนไข : กลุ่มยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ (ED ค)

ขนาดและวิธีใช้ :

- initial dose : 50 - 100 mg t.i.d
- การ titrate dose : ค่อยๆ ปรับเพิ่มขนาดยาจนคุมอาการได้ (max dose = 800 mg)
จากนั้นค่อยๆ ลดขนาดยาลงจนถึงขนาดยาที่น้อยที่สุดที่คุมอาการได้



อาการไม่พึงประสงค์ที่พบบ่อย :

- Cardiovascular : Hypotension / Orthostatic hypotension
- Dermatologic : Diminished sweating / Photosensitivity
- Gastrointestinal : Constipation / Xerostomia
- Neurologic : Akathisia / Dizziness / Drug-induced tardive dystonia / Dystonia / Extrapyrarnidal disease / Parkinsonian / Somnolence / Tardive dyskinesia
- Ophthalmic : Blurred vision / Epithelial keratopathy / Eye finding / Vision finding / Retinitis pigmentosa
- Renal : Urinary retention
- Respiratory : Nasal congestion

ข้อห้ามใช้ :

- ผู้ที่มีภาวะ Congenital long QT syndrome / severe hypertensive หรือ hypotensive heart disease / severe CNS depression / comatose state
- ผู้ที่มีประวัติ Cardiac Arrhythmias
- ผู้ที่ได้รับยาที่มีผล prolong QT interval เช่น azole antifungal / macrolide เนื่องจากเพิ่ม risk ต่อ QT interval prolongation
- ผู้ที่มีความบกพร่องทางพันธุกรรมที่ส่งผลให้ CYP2D6 activity ลดลง
- ผู้ที่ได้รับยาที่มีผลยับยั้ง CYP2D6 เช่น Fluoxetine เนื่องจากเพิ่ม risk ต่อ cardiotoxicity
- ผู้ที่ได้รับยาที่มีผลยับยั้ง Thioridazine metabolism เช่น Propranolol เนื่องจากเพิ่ม risk ต่อ cardiotoxicity

Reference :

Thioridazine. In: In Depth Answers [database on the Internet]. Greenwood Village (CO): IBM Corporation; 2020 [cited 2021 Jan 14]. Available from: www.micromedexsolutions.com.