

TRAMADOL 50 MG IMMEDIATE-RELEASE CAPSULE

ชื่อการค้า: Tradolgesic®

ข้อบ่งใช้ : Pain management; moderate to severe

เงื่อนไข : กลุ่มยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ (ED ข)

กลุ่มยา : Analgesics (Opioids)

ขนาดและวิธีใช้ :

- 50 - 100 mg q 4 - 6 hrs. (max: 400 mg/day)



อาการไม่พึงประสงค์ที่พบบ่อย :

- Dermatologic : Flushing (7.7 - 15.8%) / Pruritus (3 - 11.9%)
- Gastrointestinal : Constipation (10 - 46%) / Nausea (13 - 40%) / Vomiting (3 - 17%) / Xerostomia (1 - 10%)
- Neurologic : Dizziness (7% - 33%) / Headache (3% - 32%) / Insomnia (1% - 10.9%) / Somnolence (4% - 25%)

ข้อห้ามใช้ :

- เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 12 ปี
- ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ที่ผ่านการผ่าตัดต่อมทอลซิลหรือต่อมอดีนอยด์
- ผู้ที่มีภาวะการกีดขวางทางหายใจ
- ผู้ที่มีภาวะ bronchial asthma ทั้งแบบเฉียบพลันและเรื้อรัง ซึ่งทำการรักษาในสถานพยาบาลที่ไม่มีอุปกรณ์ช่วยชีวิต
- ผู้ที่มีภาวะ Gastrointestinal Obstruction และ Paralytic Ileus
- ผู้ที่แพ้ยา Tramadol และส่วนประกอบอื่นๆของยานี้ รวมถึงแพ้ยาในกลุ่ม opioids ตัวอื่นๆ
- ผู้ที่ใช้ยาในกลุ่ม MAOIs ร่วมด้วยภายใน 14 วันที่ผ่านมา

Reference :

Tramadol. In: In Depth Answers [database on the Internet]. Greenwood Village (CO): IBM Corporation; 2020 [cited 2021 Jan 10]. Available from: www.micromedexsolutions.com.