

คำแนะนำในการใช้ยาฟ้าทะลายโจร
ในช่วงที่มีการระบาดของโควิด-19

ထိုင်းတိုင်းရင်းဆေး ၅၀၀ လိုင်းကျွန်
သုံးစွဲခြင်း နည်းလမ်း

របៀបប្រើប្រាស់ឱសថបុរាណជាតិ
ស្មៅប្រមាត់មនុស្ស (ហ្វាច: ឡាយចូន)
ក្នុងអំឡុងពេលឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺកូវីដ-១៩ ។



ผงยา 400 มิลลิกรัม/แคปซูล
แอนโดรกราโฟไลด์ไม่น้อยกว่า 3%

ผู้ป่วยที่ควรได้รับยาฟ้าทะลายโจร

1. ผู้ป่วยโควิด-19 โดยให้เร็วที่สุดที่เป็นไปได้
2. มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยโควิด-19 ในวงแรก
3. มีไข้ ไอ เจ็บคอ ครั่นเนื้อครั่นตัว



ขนาดยาในผู้ใหญ่ (อายุ 12 ปีขึ้นไป)
ครั้งละ 4 แคปซูล วันละ 3 ครั้ง * กิน 5 วัน (1 กระจุก)

ขนาดยาในเด็ก (อายุ 4-11 ปี): หากกลืนแคปซูลยาได้
ครั้งละ 1 แคปซูล วันละ 3 ครั้ง * กิน 5 วัน



၁။ ဆေးမှုန့်/အတောင့် ၄၀၀ မီလီဂရမ်
၂။ Andrographolide ၃ ရာခိုင်နှုန်း အထက်

သုံးစွဲသင့်သော ပုဂ္ဂိုလ်များ

- ၁။ ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါ ဖြစ်ပွားနေသော လူနာရှင်များအနေဖြင့် အမြန်ဆုံးသုံးစွဲရန်။
- ၂။ ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါ လူနာရှင် နှင့်ထိတွေ့သော သူများ သုံးစွဲရန်။
- ၃။ ဖျားနာမှုကြောင့် ချောင်းဆိုးခြင်းနှင့် လည်ပင်းနာသူများ သုံးစွဲရန်။



လူကြီး (အသက် ၁၂ နှစ် နှင့်အထက်ရှိသူ)
တစ်ကြိမ်လျှင် ၄ တောင့်၊ တစ်နေ့လျှင် ၃ ကြိမ် * ၅ ရက် သောက်သုံးခြင်း။ (၁-ဘူး)

လူငယ် (အသက် ၄ နှစ်မှ ၁၁ နှစ်အကြား ရှိသူ)
တစ်ကြိမ်လျှင် ၁ တောင့်၊ တစ်နေ့လျှင် ၃ ကြိမ် * ၅ ရက် သောက်သုံးခြင်း။



ဖျော့ဇွန် ၄၀၀ မီလီဂရမ်/ဇွန်/ဇွန်
Andrographolide
မိနစ်တစ်ခဲ ၃ နာရီ

ဟုတ်: ၄၀၀ ယူဇာ

- မှန်သည်ဖြစ်စေ ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးကင်းစင်ပြီး ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးကင်းစင်ပြီး ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးကင်းစင်ပြီး
၁. မှန်သည်ဖြစ်စေ ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးကင်းစင်ပြီး ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးကင်းစင်ပြီး ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးကင်းစင်ပြီး
 ၂. မှန်သည်ဖြစ်စေ ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးကင်းစင်ပြီး ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးကင်းစင်ပြီး ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးကင်းစင်ပြီး
 ၃. မှန်သည်ဖြစ်စေ ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးကင်းစင်ပြီး ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးကင်းစင်ပြီး ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးကင်းစင်ပြီး



ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ချုပ် (အဖွဲ့ ၅၂ နှစ်အထက်)
ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးကင်းစင်ပြီး ၄ ဇွန်/ဇွန်/ဇွန် * ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးကင်းစင်ပြီး ၅ ဇွန် (၁ ဇွန်)

ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ချုပ် (အဖွဲ့ ၄-၅၅ နှစ်) * ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးကင်းစင်ပြီး ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးကင်းစင်ပြီး
ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးကင်းစင်ပြီး ၅ ဇွန်/ဇွန်/ဇွန် * ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးကင်းစင်ပြီး ၅ ဇွန်

ผู้ป่วยที่ตับอักเสบ ไตวายระยะ 4, 5 ใช้นาฟာရिन ความดันโลหิตต่ำ
การใช้ยาขึ้นอยู่กับดุลยพินิจแพทย์

အသုံးပြုရန်ရောဂါ ရှိသူ၊ ကျောက်ကပ်ရောဂါ အဆင့် ၄ (သို့) အဆင့် ၅ ဖြစ်သူ၊ warfarin
ဆေးဝါးသုံးစွဲသူများနှင့် သွေးအားနည်းသူ များသည် ဆရာဝန် ၏ ညွှန်ကြားချက်အတိုင်း ဖြစ်ပါသည်။

မှန်သည်ဖြစ်စေ ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးကင်းစင်ပြီး ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးကင်းစင်ပြီး ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးကင်းစင်ပြီး
၄, ၅ မှန်သည်ဖြစ်စေ ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးကင်းစင်ပြီး ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးကင်းစင်ပြီး ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးကင်းစင်ပြီး

ข้อห้ามใช้:
แพ้ฟ้าทะลายโจร ตั้งครรภ์ ให้นมบุตร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมในเวลาราชการ
ศูนย์หลักฐานเชิงประจักษ์ด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร

☎ 037-211289

တားမြစ်ချက်
ဆေးခါးကြီး(ခေါ်)ဖာထလိုင်းကျွန် မတည့်သူများ၊
ကိုယ်ဝန်ဆောင်များ၊ ကလေးနို့ကျွေးတိုက်သော မိခင်များ

သိရှိလိုသည်များ ရှိပါက ရုံးချိန်အတွင်း ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ရန်။
ထိုင်းရုံးရုံးဆေးနှင့် ဆေးပင်ဆိုင်ရာ အထောက်အထားစင်တာ

☎ 037-211289

បម្រាម : អ្នកដែលប្រតិកម្មជាមួយស្មៅប្រមាត់មនុស្ស
មានផ្ទៃពោះ ក្នុងអំឡុងពេលបំបោះដោះកូន

សាកសួរព័ត៌មានបន្ថែមក្នុងម៉ោងធ្វើការ
មជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រថៃ និងឱសថបុរាណ

☎ 037-211289





คำแนะนำ การใช้สารสกัดฟ้าทะลายโจร สำหรับโรคโควิด-19

ผู้ป่วยโควิด-19 ที่ไม่มีอาการ (asymptomatic COVID-19) สำหรับผู้ที่ตรวจพบเชื้อโควิด-19 แต่ยังไม่มีอาการป่วย แนะนำใช้สารสกัดฟ้าทะลายโจรที่มีปริมาณ andrographolide 20 มิลลิกรัม วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร เช้า กลางวัน และเย็น (รวม 60 มิลลิกรัมต่อวัน) ติดต่อกันนาน 5 วัน

ผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีอาการไม่รุนแรง ไม่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรครุนแรง/โรคร่วมสำคัญ (symptomatic COVID-19 without pneumonia and no risk factors for severe disease) สำหรับผู้ที่ตรวจพบเชื้อโควิด-19 มีอาการป่วยไม่รุนแรง แนะนำใช้สารสกัดฟ้าทะลายโจรที่มีปริมาณ andrographolide 60 มิลลิกรัม วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร เช้า กลางวัน และเย็น (รวม 180 มิลลิกรัมต่อวัน) ติดต่อกันนาน 5 วัน

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
กระทรวงสาธารณสุข



ขนาดสำหรับเสริมภูมิคุ้มกัน

สำหรับผู้ที่ต้องการรับประทานเพื่อเสริมภูมิคุ้มกัน แนะนำใช้สารสกัดฟ้าทะลายโจรที่มีปริมาณ andrographolide 10 มิลลิกรัม วันละ 1 ครั้ง ติดต่อกันนาน 5 วัน เว้น 2 วัน ต่อเนื่องกันไม่เกิน 12 สัปดาห์

