


# สถานการณ์การติดเชื้อ HIV ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประจำปี 2566

กรุงเทพมหานคร มีจำนวนประชากรในพื้นที่ 5,494,932 คน เป็นเพศชาย 2,571,974 คน เพศหญิง 2,922,958 คน เป็นกลุ่มเยาวชนที่มีอายุน้อยกว่า 25 ปี 1,361,578 คน เป็นเพศชาย 710,661 คน เพศหญิง 676,943 คน (ที่มา: กรมการปกครอง ณ เดือน ธันวาคม 2565) ในปี 2566 คาดการณ์ว่า จากจำนวนประชากรในพื้นที่ทั้งหมด มีจำนวนกลุ่มประชากรที่เข้าถึงยาก และเป็นกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสติดเชื้อเอชไอวี มากกว่ากลุ่มประชากรอื่น ได้แก่ ชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย 80,591 คน (จำแนกเป็นกลุ่มเสี่ยงสูง 41,828 คน และกลุ่มเสี่ยงต่ำ 38,763 คน) ชายขายบริการทางเพศ 4,315 คน กลุ่มสาวประเภทสอง 26,525 คน พนักงานบริการทางเพศหญิง 13,611 คน ผู้ใช้สารเสพติดชนิดฉีด 2,360 คน (ที่มา: ผล AEM กทม.ปี 2566)

ปัจจุบันกรุงเทพมหานครได้ทำการคาดการณ์ว่ามีผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีชีวิตอยู่ในปี 2566 จำนวน 80,724 คน เป็นผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ จำนวน 1,101 คน ในจำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ เป็นกลุ่มเยาวชนที่มีอายุน้อยกว่า 25 ปี จำนวน 620 คน (คิดเป็นร้อยละ 56) มีผู้เสียชีวิตภายในปี 2566 จำนวน 1,843 คน ข้อมูลจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (NAP Program :ณ 7 เม.ย. 66) ในปี พ.ศ.2565พบว่า มีผู้ที่ทราบสถานะการติดเชื้อเอชไอวีและมีชีวิตอยู่ จำนวน 83,123 คน ผู้ติดเชื้อเอชไอวีได้รับยาต้านไวรัสและมีชีวิตอยู่ จำนวน 66,068 คน และมีผลการตรวจพบว่ามีปริมาณไวรัสในกระแสเลือดน้อยกว่า1,000 copies/mL จำนวน 57,102 คน

ผลการเฝ้าระวังความชุกการติดเชื้อเอชไอวี พื้นที่กรุงเทพมหานคร ปี 2566 พบว่า ในกลุ่มพนักงานบริการทางเพศหญิงในสถานที่สาธารณะ(FSW-Non-Venue) และกลุ่มพนักงานบริการทางเพศหญิงในสถานบริการ(FSW-Venue) ไม่พบการติดเชื้อเอชไอวี ส่วนในกลุ่มชายที่มาตรวจรักษากามโรค(MSTD) พบความชุกการติดเชื้อเอชไอวี ร้อยละ 6.6 และกลุ่มผู้ใช้สารเสพติดชนิดฉีด (PWID) ร้อยละ 16.9 ในขณะที่การติดเชื้อเอชไอวี กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ (ANC) ตัวแทนของกลุ่มประชากรทั่วไปมีความชุกการติดเชื้อเอชไอวี ร้อยละ 0.97 ส่วนการเฝ้าระวังการติดเชื้อเอชไอวี ในกลุ่มประชากรหลัก หรือกลุ่มประชากรที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี ร่วมกับกองระบาดวิทยา ในปี 2563 ผลการเฝ้าระวังการติดเชื้อเอชไอวี และพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวี(BBS) ในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย พบว่า กลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์กับชายติดเชื้อเอชไอวี ร้อยละ 6.95 และกลุ่มสาวประเภทสอง (TG) ร้อยละ 6.19 จากสถานการณ์ดังกล่าว กลุ่มเป้าหมายที่เข้าถึงยากและกลุ่มเยาวชนยังมีความชุกของการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มาก ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องพร้อมกับการส่งเสริมความเท่าเทียมในการเข้าถึงบริการสุขภาพในทุกกลุ่มประชากร เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย ยุติปัญหาเอดส์ ภายในปี 2573 ต่อไป

ความชุกการติดเชื้อ HIV ปี พ.ศ.2565



\*MSM/TG ใช้ข้อมูลเดิมจาก ปี 2563  
ANC ใช้ข้อมูลจาก ระบบรายงาน PHIMS

จำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ ปี พ.ศ.2565 จำแนกตามกลุ่มประชากร

